

3. März 2015

3. Übungsblatt Reell-algebraische Geometrie

Aufgabe 1: (4 Punkte)

- a) Berechnen Sie die Resultante der beiden Polynome $f = X^3 + 2X + 1$ und $g = X^2 + 3$!
- b) Für welche Primzahlen p gibt es eine ganze Zahl x , für die sowohl $f(x)$ als auch $g(x)$ durch p teilbar sind?

Aufgabe 2: (5 Punkte)

- a) Für welche Werte von Y haben die beiden Polynome $f = X^2 + XY + Y$ und $g = X^2 - Y^2$ aus $\mathbb{Q}[X, Y]$ einen gemeinsamen Faktor positiven Grades?
- b) Geben Sie diesen Faktor jeweils an!
- c) Bestimmen Sie alle Paare $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, für die $f(x, y) = g(x, y) = 0$ ist!

Aufgabe 3: (7 Punkte)

- a) Zeigen Sie: Wenn eine kubische Gleichung mit reellen Koeffizienten eine mehrfache Nullstelle hat, sind alle ihre Nullstellen reell.
- b) Konstruieren Sie mit Hilfe einer geeigneten Resultante ein Polynom in p und q , das genau dann verschwindet, wenn die kubische Gleichung $x^3 + px + q = 0$ eine mehrfache Nullstelle hat!
- c) Welche Bedingungen müssen p und q erfüllen, damit die Gleichung eine dreifache Nullstelle hat?
- d) Geben Sie ein Polynom in a, b, c an, die genau dann verschwinden, wenn die Gleichung $x^3 + ax^2 + bx + c$ eine dreifache Nullstelle hat!

Aufgabe 4: (4 Punkte)

Die Kurve $C \subset \mathbb{R}^2$ sei parametrisch gegeben durch die Vorschrift $x = t^2 + 1$ und $y = t^2 - t$. Finden Sie ein Polynom $F \in \mathbb{R}[X, Y]$, das auf allen Kurvenpunkten verschwindet!

Abgabe bis zum Dienstag, dem 10. März 2015, um 15.30 Uhr