Wolfgang K. Seiler
Tel. 2515

A5, Zimmer C 201

Themenvorschläge für die kleinen Übungen am 22./23. April 2002

a) Welche der folgenden Mengen sind $\mathbb{R}$-Vektorräume?

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x+y \\ y \end{pmatrix} \;\middle|\; x, y \in \mathbb{R} \right\}, \qquad V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x+1 \\ x+2 \end{pmatrix} \;\middle|\; x \in \mathbb{R} \right\},$$

$$V_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2+y^2+z^2 = 1 \right\}, \qquad V_4 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; xy = 0 \right\},$$

$$V_5 = \left\{ f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \;\middle|\; f'(2) = 0 \right\}, \qquad V_6 = \left\{ f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \;\middle|\; f'(2) = 2 \right\}$$

b) *Richtig oder falsch:* Sind $\varphi, \psi\colon V \to W$ zwei lineare Abbildungen, so sind auch die Abbildungen $\varphi \pm \psi\colon V \to W$ mit $(\varphi \pm \psi)(\vec{v}) = \varphi(\vec{v}) \pm \psi(\vec{v})$ linear.

c) Welche der folgenden Abbildungen sind linear?

$$\varphi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3;\quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+2y \\ y+2z \\ z+2 \end{pmatrix}, \qquad \psi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3;\quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+2y+3z \\ 2x+3y+4z \\ 3x+4y+5z \end{pmatrix},$$

$$\omega\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3;\quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+y+z \\ xy+yz+xz \\ xyz \end{pmatrix}$$

d) Bestimmen Sie im linearen Fall Kern und Bild der Abbildung!

e) Welche der folgenden Mengen sind Untervektorräume von $V = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$?

$$U_1 = \left\{ f \in V \;\middle|\; f(t) = f(-t) \text{ für alle } t \in \mathbb{Z} \right\}, \quad U_2 = \left\{ f \in V \;\middle|\; f(t) = -f(-t) \text{ für alle } t \in \mathbb{R} \right\},$$
$$U_3 = \left\{ f \in V \;\middle|\; f(t) = f(t^2) \text{ für alle } t \in \mathbb{Z} \right\}, \quad U_4 = \left\{ f \in V \;\middle|\; f(t) = f(t+1) \text{ für alle } t \in \mathbb{R} \right\}$$

f) U sei ein Untervektorraum von V, und $\varphi\colon V \to W$ sei eine lineare Abbildung. Zeigen Sie: Dann ist auch die Einschränkung $\varphi_{|U}\colon \begin{cases} U \to W \\ \vec{v} \mapsto \varphi(\vec{v}) \end{cases}$ eine lineare Abbildung.

g) Folgern Sie, daß $\varphi\colon \begin{cases} \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \to \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f \mapsto f' \end{cases}$ eine lineare Abbildung ist, und bestimmen Sie deren Kern und Bild!

h) Zeigen Sie: $W = \left\{ a \sin^2 t + b \cos^2 t + c \;\middle|\; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ ist ein Untervektorraum von $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$!

i) Bestimmen Sie Kern und Bild der linearen Abbildung

$$\varphi\colon W \to \mathbb{R}^3;\quad f \mapsto \begin{pmatrix} f(0) \\ f(\frac{\pi}{2}) \\ f(\pi) \end{pmatrix} \;!$$

j) Bestimmen Sie Kern und Bild der Abtastungsabbildung

$$\varphi\colon \begin{cases} \left\{ a \sin t + b \sin 2t + c \sin 4t \;\middle|\; a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \to \mathbb{R}^5 \\ f \mapsto \left((f(0), f\left(\frac{\pi}{2}\right), f(\pi), f\left(\frac{3\pi}{2}\right), f(2\pi) \right) \end{cases} \;!$$