

21. April 2017

## Modulklausur Elemente der Funktionentheorie

- Schreiben Sie bitte auf jedes Blatt Ihren Namen! •••  
••• Die Aufgaben müssen *nicht* in der angegebenen Reihenfolge •••  
••• bearbeitet werden; konzentrieren sie sich zunächst •••  
••• auf das, womit sie schnell Punkte holen können! •••

### Aufgabe 1: (10 Punkte)

Berechnen Sie die folgenden komplexen Zahlen:

a)  $(i+3)(i-3)$     b)  $\frac{3+4i}{1-2i}$     c)  $(i-1)^2$     d)  $\frac{(i-1)^{100}}{2^{50}}$     e)  $\sqrt{i}$

**Lösung:**

a)  $(i+3)(i-3) = i^2 - 3^2 = -10$

b)  $\frac{3+4i}{1-2i} = \frac{(3+4i)(1+2i)}{1^2+2^2} = \frac{-5+10i}{5} = -1+2i$

c)  $(1-i)^2 = 1^2 - 2i + i^2 = -2i$

d)  $\frac{(i-1)^{100}}{2^{50}} = \frac{(-2i)^{50}}{2^{50}} = (-i)^{50} = (-i)^{48} \cdot (-i)^2 = -1$

e)  $i = e^{\pi i/2}$ , also ist  $e^{\pi i/4} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$  die eine Quadratwurzel; die andere ist natürlich  $-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ .

### Aufgabe 2: (8 Punkte)

a) Zeigen Sie: Jede komplexe Zahl  $z$  vom Betrag eins läßt sich darstellen in der Form  $z = w/\bar{w}$  mit  $w \in \mathbb{C}$ .

**Lösung:** Eine komplexe Zahl  $z$  vom Betrag eins hat in Polarkoordinaten eine Darstellung der Form  $z = e^{i\varphi}$ . Schreiben wir auch  $w = re^{i\psi}$  in Polarkoordinaten, ist

$$\frac{w}{\bar{w}} = \frac{re^{i\psi}}{re^{-i\psi}} = e^{i \cdot 2\psi}.$$

Mit beliebigem  $r > 0$  und  $\psi = \frac{1}{2}\varphi$  ist also  $w = re^{i\psi}$  eine Zahl mit  $\frac{w}{\bar{w}} = z$ .

b) Wie viele mögliche Zahlen  $w$  gibt es, wenn noch zusätzlich verlangt wird, daß auch  $w$  den Betrag eins haben soll?

**Lösung:** Nun muß  $r = 1$  sein, also suchen wir Zahlen  $w = e^{i\psi}$  mit  $e^{i \cdot 2\psi} = e^{i\varphi}$ . Außer  $\psi = \varphi/2$  hat auch  $\pi + \varphi/2$  noch diese Eigenschaft; es gibt also die beiden Lösungen  $w_1 = e^{i\varphi/2}$  und  $w_2 = e^{i(\pi+\varphi/2)} = -e^{i\varphi/2} = -w_1$ .

c) Zeigen Sie, daß dann  $w/\bar{w} = w^2$  ist!

**Lösung:** Wegen  $|w| = 1$  ist  $w\bar{w} = 1$ , d.h.  $\frac{w}{\bar{w}} = \frac{w^2}{w\bar{w}} = w^2$ .

**Aufgabe 3: (12 Punkte)**

Entscheiden Sie, ob die folgenden Funktionen irgendwo holomorph sind, und geben Sie gegebenenfalls das größtmögliche Teilgebiet  $G$  von  $\mathbb{C}$  an, auf dem dies der Fall ist! Untersuchen Sie auch, ob die jeweilige Funktion in den Punkten, in denen sie nicht holomorph ist, meromorph ist!

$$a) f(z) = e^{\sin(e^z + z^2)} \quad b) f(z) = |z|^2 - 2(\operatorname{Im} z)^2 + 2i(\operatorname{Re} z)(\operatorname{Im} z) \quad c) f(z) = z^2 + (\bar{z})^2$$

$$d) f(z) = \frac{21z}{(z^2 + 4)(z^2 + 2017)}$$

Begründen Sie ihre Aussagen!

**Lösung:**

a) Da sowohl die Exponentialfunktion als auch der Sinus auf ganz  $\mathbb{C}$  holomorph sind, ist auch  $f$  auf ganz  $\mathbb{C}$  holomorph.

b) Für  $z = x + iy$  mit  $x, y \in \mathbb{R}$  ist

$$f(z) = x^2 + y^2 - 2y^2 + 2ixy = x^2 + 2ixy - y^2 = (x + iy)^2 = z^2,$$

und diese Funktion ist natürlich auf ganz  $\mathbb{C}$  holomorph.

c) Hier ist für  $z = x + iy$

$$f(z) = (x^2 - y^2) + 2ixy + (x^2 - y^2) - 2ixy = 2(x^2 - y^2) \in \mathbb{R}$$

für alle  $z \in \mathbb{C}$ . Da die Funktion nicht konstant ist, kann sie nicht holomorph sein, was man auch direkt aus den CAUCHY-RIEMANNschen Differentialgleichungen ablesen kann:  $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$  mit  $u(x, y) = 2(x^2 - y^2)$  und  $v(x, y)$  identisch Null. Da weder  $u_x(x, y) = 4x$  noch  $u_y(x, y) = -4y$  identisch verschwindet, ist keine der beiden Gleichungen erfüllt.

d) Der Nenner dieser Funktion verschwindet bei  $z = \pm 2i$  und  $z = \pm\sqrt{2017}i$ , ohne daß dort der Zähler verschwindet. Somit hat die Funktion dort Pole und ist nur holomorph auf  $\mathbb{C}$  ohne diese vier Punkte. Da sie dort Pole hat, ist sie meromorph auf ganz  $\mathbb{C}$ , als rationale Funktion sogar auf  $\hat{\mathbb{C}}$ .

**Aufgabe 4: (8 Punkte)**

$D$  sei die Kreisscheibe mit Radius eins um den Nullpunkt, und  $\Delta$  sei das Dreieck mit den dritten Einheitswurzeln  $1$ ,  $\zeta_3 = \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3})$  und  $\bar{\zeta}_3 = \frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3})$  als Ecken. Weiter sei  $f$  eine im Gebiet  $G = \{z \in \mathbb{C} \mid \frac{1}{4} < |z| < 5\}$  holomorphe Funktion. Dann gilt

$$\int_{\partial D} f(z) dz = \int_{\partial \Delta} f(z) dz.$$

(Hinweis: Betrachten Sie die drei Dreiecksseiten jeweils einzeln, zusammen mit den darüberliegenden Drittelkreisen.)

**Lösung:**  $\Delta$  ist ein gleichseitiges Dreieck dessen Umkreis der Einheitskreis  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$  ist. Der Inkreis hat ebenfalls den Nullpunkt als Mittelpunkt und berührt die Kantenmittelpunkte, also beispielsweise den Punkt  $z = -\frac{1}{2}$  auf der Kante von  $\zeta_3$  nach  $\bar{\zeta}_3$ . Somit hat er den Radius  $\frac{1}{2}$ , d.h. alle Kanten liegen vollständig im Gebiet  $G$ . Sind  $\gamma_1, \gamma_2$  und  $\gamma_3$  die drei Integrationswege, die jeweils eine der drei Kanten im Uhrzeigersinn durchlaufen und dann über einen Drittel Einheitskreisbogen im Gegenuhrzeigersinn zum Ausgangspunkt zurückkehren, ist

$$\int_{\partial D} f(z) dz - \int_{\partial \Delta} f(z) dz = \sum_{k=1}^3 \int_{\gamma_k} f(z) dz.$$

Die drei Integrale rechts verschwinden nach dem CAUCHYSchen Integralsatz, da die drei Wege  $\gamma_k$  ganz in  $G$  liegen und  $f$  dort holomorph ist; somit müssen die beiden Integrale links gleich sein.

**Aufgabe 5:** (15 Punkte)

D sei die Kreisscheibe mit Radius zwei um den Nullpunkt. Berechnen Sie die folgenden Integrale:

$$a) \int_{\partial D} |z|^2 dz \quad b) \int_{\partial D} \frac{dz}{z-1} \quad c) \int_{\partial D} \frac{5z}{z-3} dz \quad d) \int_{\partial D} \frac{2z}{z^2-2z+2} dz \quad e) \int_{\partial D} \frac{\cos z}{z^3} dz$$

**Lösung:**

a) Auf dem Rand von D ist  $|z| = 2$ ; somit ist

$$\int_{\partial D} |z|^2 dz = \int_{\partial D} 4 dz = 0$$

nach dem CAUCHYSchen Integralsatz.

b) Der Integrand hat in D genau eine Polstelle, nämlich bei  $z = 1$ . Das Residuum dort ist gleich eins, denn die LAURENT-Reihe um eins ist gerade  $1/(z-z_0)$ . Somit hat das Integral nach dem Residuensatz den Wert  $2\pi i$ .

c) Dieser Integrand ist holomorph auf der offenen Kreisscheibe mit Radius fünf um den Nullpunkt, die den Abschluß von D enthält; daher verschwindet das Integral nach dem CAUCHYSchen Integralsatz.

d)  $z^2-2z+2 = (z-1)^2+1$  verschwindet in den beiden Punkten  $z_1 = 1+i$  und  $z_2 = 1-i$ ; beide liegen im Innern von D. Der Integrand hat an beiden Stellen einen Pol erster Ordnung; wir können das Residuum daher nach der Limesformel berechnen:

$$\text{Res}_{z_1} \frac{2z}{(z-z_1)(z-z_2)} = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{2z \cdot (z-z_2)}{(z-z_1)(z-z_2)} = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{2z}{z-z_2} = \frac{2z_1}{z_1-z_2} = \frac{2+2i}{2i} = 1-i$$

und

$$\text{Res}_{z_2} \frac{2z}{(z-z_1)(z-z_2)} = \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{2z \cdot (z-z_1)}{(z-z_1)(z-z_2)} = \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{2z}{z-z_1} = \frac{2z_2}{z_2-z_1} = \frac{2-2i}{-2i} = 1+i.$$

Nach dem Residuensatz ist daher

$$\int_{\partial D} \frac{2z}{z^2-2z+2} dz = 2\pi i \cdot ((1-i) + (1+i)) = 4\pi i.$$

e) Der Kosinus ist auf ganz  $\mathbb{C}$  holomorph; dividieren wir durch  $z^3$ , entsteht an der Stelle  $z = 0$  ein Pol dritter Ordnung. Dividieren wir die TAYLOR-Reihe des Kosinus durch  $z^3$ , so erhalten wir die LAURENT-Reihe des Integranden um den Punkt  $z = 0$ :

$$\frac{\cos z}{z^3} = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{2z} + \frac{z}{24} - \frac{z^3}{720} + \dots,$$

das Residuum im Punkt Null ist somit gleich  $-\frac{1}{2}$ . Damit ist das Integral nach dem Residuensatz gleich  $2\pi i \cdot (-\frac{1}{2}) = -\pi i$ .

**Aufgabe 6:** (7 Punkte)

Berechnen Sie  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{20x}{(x^2 + 1)(x^2 - 2x + 5)} dx$ !

**Lösung:**  $z^2 - 2z + 5 = (z - 1)^2 + 4$  verschwindet für  $z = 1 \pm 2i$ , hat also genau wie  $z^2 + 1$  keine reellen Nullstellen. Da der Nennergrad vier den Zählergrad eins um mindestens zwei übersteigt und der Nenner keine reellen Nullstellen hat, können wir das Integral somit berechnen als  $2\pi i$  mal der Summe der Residuen an den Polstellen mit positivem Imaginärteil, also bei  $z_1 = i$  und  $z_2 = 1 + 2i$ . Da der Nenner vier verschiedene Nullstellen hat, sind alle einfach, d.h. wir haben bei  $z_1$  und  $z_2$  Pole erster Ordnung und können die Residuen über die Limesformel berechnen:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_i \frac{20z}{(z^2 + 1)(z^2 - 2z + 5)} &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{20z(z - i)}{(z^2 + 1)(z^2 - 2z + 5)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{20z}{(z + i)(z^2 - 2z + 5)} \\ &= \frac{20i}{2i \cdot (-1 - 2i + 5)} = \frac{10}{4 - 2i} = \frac{5}{2 - i} = \frac{10 + 5i}{2^2 + 1^2} = 2 + i \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{1+2i} \frac{20z}{(z^2 + 1)(z^2 - 2z + 5)} &= \lim_{z \rightarrow 1+2i} \frac{20z(z - 1 - 2i)}{(z^2 + 1)(z^2 - 2z + 5)} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1+2i} \frac{20z}{((1 + 2i)^2 + 1)((1 + 2i) - (1 - 2i))} = \frac{20 + 40i}{(-2 + 4i) \cdot 4i} \\ &= \frac{20 + 40i}{-16 - 8i} = -\frac{5 + 10i}{4 + 2i} = -\frac{(5 + 10i)(4 - 2i)}{4^2 + 2^2} = -\frac{40 + 30i}{20} = -2 - \frac{3}{2}i. \end{aligned}$$

Die Summe der beiden Residuen ist somit  $-\frac{1}{2}i$ ; Multiplikation mit  $2\pi i$  ergibt

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{20x}{(x^2 + 1)(x^2 - 2x + 5)} dx = \pi.$$